

核准日期：2020年12月21日  
修改日期：2021年03月12日  
修改日期：2021年06月25日


## 紫杉醇注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用



**警告：**  
本品在专业使用细胞毒化疗药物的医疗机构进行，并在有经验的肿瘤专科医生指导下使用。  
对紫杉醇注射液过敏者、基线中性粒细胞计数少于1500个/mm<sup>3</sup>的实体瘤患者或者基线中性粒细胞计数少于1000个/mm<sup>3</sup>的无转移性乳腺癌患者、怀孕和哺乳妇女禁用。

**【药品名称】**  
通用名称：紫杉醇注射液  
英文名称：Paclitaxel Injection  
汉语拼音：Zishanchun Zhusheyey  
**【成份】**  
本品主要成份为紫杉醇  
化学名称：(1R,2S)-环己-1,2a,4,7b,10b,13a-六羟基紫杉醇-11-β-9-肟；10-二乙酰基-2-萘甲酰肼-13β-肟(2R,3S)-甲氧基-3-萘基苯基醚。  
化学结构式：



分子式：C<sub>47</sub>H<sub>51</sub>N<sub>2</sub>O<sub>9</sub>  
分子量：853.9  
本品为多次注射的制剂规格，每毫升含紫杉醇注射液中含有60mg紫杉醇，527mg纯化的聚氧乙基蓖麻油（Cremophor EL）和40%（w/v）的氯化钠注射液。  
紫杉醇是一种具有抗增殖性的天然产物，紫杉醇是一种白色或类白色结晶状粉末，具有高度亲水性，不溶于水。

**【性状】**  
本品为白色至微黄色的澄明液体。  
**【适应症】**  
晚期乳腺癌的一线治疗。  
晚期鳞状细胞癌患者在紫杉醇标准方案联合化疗后的辅助治疗。  
转移性乳腺癌联合化疗失败或者辅助化疗6个月内复发的乳腺癌患者。  
非小细胞肺癌的一线治疗。  
宫颈癌（AIDS）相关卡波西氏肉瘤（Kaposi's sarcoma）的二线治疗。

**【规格】**  
(1) 5ml:30mg  
(2) 16.7ml:100mg

**【用法用量】**  
注意：不得将未经稀释的浓缩液滴入配有灌注液滴管的聚氧乙基泡沫（PVC）器皿。为减少患者接触到可能由聚氧乙基的降解液或其他装置材料释放出的D10H11材料物质，（2-乙氧基乙基）-2-萘甲酰肼。  
紫杉醇（AIDS）相关卡波西氏肉瘤：每周静脉滴注150mg/m<sup>2</sup>，灌注时间大于90分钟。  
注意：不得将未经稀释的浓缩液滴入配有灌注液滴管的聚氧乙基泡沫（PVC）器皿。为减少患者接触到可能由聚氧乙基的降解液或其他装置材料释放出的D10H11材料物质，（2-乙氧基乙基）-2-萘甲酰肼。  
紫杉醇（AIDS）相关卡波西氏肉瘤：每周静脉滴注150mg/m<sup>2</sup>，灌注时间大于90分钟。  
注意：不得将未经稀释的浓缩液滴入配有灌注液滴管的聚氧乙基泡沫（PVC）器皿。为减少患者接触到可能由聚氧乙基的降解液或其他装置材料释放出的D10H11材料物质，（2-乙氧基乙基）-2-萘甲酰肼。  
紫杉醇（AIDS）相关卡波西氏肉瘤：每周静脉滴注150mg/m<sup>2</sup>，灌注时间大于90分钟。

**【不良反应】**  
紫杉醇的严重不良反应包括：接受本品治疗的患者可能出现过敏反应。患者在本品治疗前及治疗24小时内给予地塞米松20mg口服，或在本品之前30-60分钟给予地塞米松20mg，苯海拉明（或同类药物）50mg，在紫杉醇之前30-60分钟静注或深肌注射，以及在注射本品之前30-60分钟给予紫杉醇注射液咪唑丁（300mg）或氯马斯汀（50mg）。  
**【禁忌】**  
对紫杉醇患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 对于未治疗的卵巢癌患者，推荐禁用下列疗法，即顺铂1次，或在选用的治疗方案中，应考虑其不同的毒性。  
2. 对于已经接受过化疗的卵巢癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

对非小细胞肺癌患者推荐禁用方案为：  
175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂，灌注时间大于24小时，并给予顺铂150mg/m<sup>2</sup>。  
2. 对于已经接受过化疗的肺癌患者，目前数据和方案有几种，但最佳的剂量方案还不清楚，推荐治疗方案为：静注顺铂150mg/m<sup>2</sup>或顺铂75mg/m<sup>2</sup>，每3周1次，持续4个疗程。  
对乳腺癌患者，推荐禁用下列疗法：  
1. 1项乳腺癌辅助治疗的辅助治疗方案：剂量为175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂大于3小时，每周1次，4个疗程，在含铂化疗化后继续治疗。  
2. 初始化疗失败的转移性或辅助化疗6个月内复发的患者的有效治疗方案为：175mg/m<sup>2</sup>，静注顺铂3小时，每周1次。

	1 <sup>a</sup>	2 <sup>b</sup>	3 <sup>c</sup>	4 <sup>d</sup>
● 严重症状	21 <sup>a</sup>	2 <sup>b</sup>	3 <sup>c</sup>	4 <sup>d</sup>
● 恶心和呕吐				
-任何症状	88	93	65	69
-严重症状	18	24	10	11
● 肌痛/关节痛				
-任何症状	69 <sup>a</sup>	27 <sup>b</sup>	9 <sup>c</sup>	2 <sup>d</sup>
-严重症状	6 <sup>a</sup>	1	1	1
● 腹泻				
-任何症状	37 <sup>a</sup>	29 <sup>b</sup>	16 <sup>c</sup>	8 <sup>d</sup>
-严重症状	2	3	4	1
● 乏力				
-任何症状	NC	NC	17 <sup>c</sup>	10 <sup>d</sup>
-严重症状	NC	NC	1	1
● 脱发				
-任何症状	96 <sup>a</sup>	89 <sup>b</sup>	55 <sup>c</sup>	37 <sup>d</sup>
-严重症状	51 <sup>a</sup>	21 <sup>b</sup>	6	8

<sup>a</sup>根据最差疗效分析；  
<sup>b</sup>紫杉醇量（mg/m<sup>2</sup>）输注时间（小时）；  
<sup>c</sup>环磷酰胺（C）或顺铂（D）剂量75mg/m<sup>2</sup>；  
<sup>d</sup>F5a3骨髓检查P<0.05；  
协作组研究中<130,000/mm<sup>3</sup>；  
协作组研究中<20g/dL；  
<sup>e</sup>所有患者事先预防用药；  
<sup>f</sup>GOG-111研究中，神经毒性归入在外周神经疾病中，而在协作组研究中，神经毒性归入在运动障碍或感觉神经疾病中。

<sup>a</sup>根据最差疗效分析；  
<sup>b</sup>紫杉醇量（mg/m<sup>2</sup>）输注时间（小时）；  
<sup>c</sup>所有患者事先预防用药；  
<sup>d</sup>严重事件定义为至少III级毒性；  
<sup>e</sup>NC没有发生；  
<sup>f</sup>紫杉醇给药时：对于卵巢癌紫杉醇单药二线治疗的III期研究中的403名患者，下表列出了重要不良事件的发生情况。

	患者百分率			
	T1753 <sup>a</sup> (n=455)	C750 <sup>b</sup> (n=105)	T13524 <sup>c</sup> (n=398)	C750 <sup>b</sup> (n=105)
● 骨髓				
-中性粒细胞减少				
<2000/mm <sup>3</sup>	78	98	78	98
<500/mm <sup>3</sup>	27	75	14	67
-最低值减少				
<100,000/mm <sup>3</sup>	4	18	8	6
<50,000/mm <sup>3</sup>	1	7	2	1
-贫血				
<8g/dL	84	90	68	88
<6g/dL	11	12	6	8
-感染	26	29	20	18
● 过敏反应				
-任何症状	41	45	38	45
-严重症状	2	0	2	1
● 外周神经病变				
-任何症状	63	60	55	42
-严重症状	1	0	0	0
● 粘膜炎				
-任何症状	17	35	21	25
-严重症状	0	3	0	2

<sup>a</sup>根据最差疗效分析；  
<sup>b</sup>紫杉醇量（mg/m<sup>2</sup>）输注时间（小时）；  
<sup>c</sup>所有患者事先预防用药；  
<sup>d</sup>严重事件定义为至少III级毒性；  
<sup>e</sup>紫杉醇给药时：对于卵巢癌紫杉醇单药二线治疗的III期研究中的403名患者，下表列出了重要不良事件的发生情况。

	患者百分率			
	T1753 <sup>a</sup> (n=455)	C750 <sup>b</sup> (n=105)	T13524 <sup>c</sup> (n=398)	C750 <sup>b</sup> (n=105)
● 骨髓				
-中性粒细胞减少				
<2000/mm <sup>3</sup>	78	98	78	98
<500/mm <sup>3</sup>	27	75	14	67
-最低值减少				
<100,000/mm <sup>3</sup>	4	18	8	6
<50,000/mm <sup>3</sup>	1	7	2	1
-贫血				
<8g/dL	84	90	68	88
<6g/dL	11	12	6	8
-感染	26	29	20	18
● 过敏反应				
-任何症状	41	45	38	45
-严重症状	2	0	2	1
● 外周神经病变				
-任何症状	63	60	55	42
-严重症状	1	0	0	0
● 粘膜炎				
-任何症状	17	35	21	25
-严重症状	0	3	0	2

<sup>a</sup>根据最差疗效分析；  
<sup>b</sup>紫杉醇量（mg/m<sup>2</sup>）输注时间（小时）；  
<sup>c</sup>所有患者事先预防用药；  
<sup>d</sup>严重事件定义为至少III级毒性；  
<sup>e</sup>紫杉醇给药时：对于卵巢癌紫杉醇单药二线治疗的III期研究中的403名患者，下表列出了重要不良事件的发生情况。

<sup>a</sup>根据最差疗效分析；  
<sup>b</sup>紫