

盐酸尼卡地平注射液

关于处方医生和其他卫生保健专业人员的重要信息

（一）盐酸尼卡地平注射液（10mg/10ml）的重要信息：

本项目旨在为您提供有关使用盐酸尼卡地平注射液静脉注射时应遵循的适应症、给药方法和安全预防措施的重要信息。

（二）关于盐酸尼卡地平注射液：

尼卡地平是一种抗高血压药物，通过使血管放松来降低血压。

它起到钙通道阻断剂的作用：这意味着它阻断细胞表面被称为钙通道的特殊通道，钙离子通常通过这些通道进入细胞。当钙离子进入血管壁肌肉中的细胞时，就会引起收缩。尼卡地平通过减少钙流入细胞，防止细胞收缩，从而帮助血管放松。

尼卡地平应通过连续静脉输注给药。它只能由专家在控制良好的环境中使用，并持续监测血压。

在成人中，治疗应从以 3-5 mg/h 的速率连续给药尼卡地平开始。然后可以增加速率，但不应超过 15 mg/h。当达到目标血压时，应逐渐减少剂量。

尼卡地平应谨慎使用，并在特定患者群体中以较低剂量使用，包括有肝肾问题患者和儿童。

（三）适应症

静脉注射尼卡地平用于在特定环境中治疗高血压，并进行适当的专家干预和监测。

盐酸尼卡地平注射液 10mg/10ml 适用于治疗急性危及生命的高血压，尤其是在以下情况下：

- 恶性动脉高压/高血压性脑病
- 主动脉夹层，当短效 β 受体阻滞剂治疗不合适时，或当单独 β 受体阻滞剂无效时与 β 受体阻滞剂联合使用
- 严重先兆子痫，不推荐或禁忌使用其他静脉降压药
- 尼卡地平也适用于治疗术后高血压

（四）禁忌症

- 已知对尼卡地平或说明书中列出的任何成分过敏。
- 严重主动脉狭窄
- 代偿性高血压，即动静脉分流术或主动脉弓的情况。
- 不稳定型心绞痛
- 心肌梗死后 8 天内
- 患有罕见的果糖不耐受遗传问题的患者不应使用这种药物

（五）给药方法

尼卡地平只能由专家在控制良好的环境中（如医院和重症监护室）持续静脉输注，并持续监测血压。

（一）静脉注射尼卡地平期间需要记住的要点：

1. 给药的速度必须通过使用电子注射器驱动器或容积泵来精确控制。
2. 在输注过程中，必须至少每 5 分钟监测一次血压和心率，直到生命体征稳定，但在尼卡地平给药结束后至少监测 12 小时。
3. 可能发生输注部位反应，特别是在给药持续时间延长的情况下和在外周静脉中。如果怀疑输液部位刺激，建议更换输液部位。使用中心静脉管线或溶液的更大稀释度可以降低输液部位反应发生的风险。

（六）用量：

降压效果将取决于给药的剂量。达到预期血压的剂量方案可以根据目标血压、患者的反应以及患者的年龄或状态而变化。有关给药的更多信息，请参阅产品说明书。

（七）不良事件报告：

应报告不良事件。报告表格和信息可在 <https://www.huiyupharma.com/feedback.aspx?nid=9> 上找到。不良事件也应通过电话 0832-8808022 或电子邮件发送至 phv@huiyupharma.com。报告时，请提供尽可能多的信息，包括病史、任何伴随用药、副作用发生时间和治疗日期。

（八） 公司联系方式

如果您有任何问题或需要更多信息, 请联系四川汇宇制药股份有限公司药物警戒部:

电子邮件: phv@huiyupharma.com

电话: 0832-8808022