

患者提示卡

提醒卡包含重要的安全信息，您需要在使用注射用唑来膦酸浓溶液治疗癌症相关疾病之前和期间了解这些信息。

OSTEONECROSIS OF THE JAW (ONJ) 颌骨坏死 (ONJ)

您的医生建议您接受注射用唑来膦酸浓溶液注射，以帮助预防骨转移引起的骨并发症(例如：骨折)和/或减少成人患者血液中的钙含量，因为肿瘤的存在导致钙含量过高。

在接受注射用唑来膦酸浓溶液治疗癌症相关疾病的患者中，一种被称为颌骨骨坏死(ONJ)(颌骨骨损伤)的副作用已被报道。ONJ也可能在停止治疗后发生。

为了降低患ONJ的风险，您应该采取一些预防措施：

开始治疗前：

- 在您开始治疗之前，请您的医生告诉您有关ONJ的信息
- 在开始使用唑来膦酸治疗之前，请咨询您的医生是否建议进行牙科检查
- 如果您的口腔或牙齿有任何问题，请告诉您的医生/护士（医疗保健专业人员）

接受牙科手术（例如：拔牙）的患者、未接受常规牙科护理或患有牙龈疾病的患者、吸烟者、接受不同类型的癌症治疗或先前接受过双膦酸盐治疗（用于治疗或预防骨骼疾病）可能有发生ONJ更高的风险。

治疗期间

- 你应该保持良好的口腔卫生，确保你的假牙佩戴合适，并接受定期牙科检查
- 如果您正在接受牙科治疗或将接受牙科手术（例如：拔牙），请通知您的医生并告诉您的牙医您正在接受注射用唑来膦酸浓溶液治疗
- 如果您的口腔或牙齿出现任何问题（例如：牙齿松动、疼痛或肿胀、伤口不愈合或有分泌物），请立即联系您的医生和牙医，因为这些可能是ONJ的迹象

阅读说明书了解更多信息。

报告副作用

如果您有任何副作用，请咨询您的医生、药剂师或护士。这包括包装说明书中未列出的任何可能的副作用。您可以通过以下方式向我们报告不良反应：

药物警戒专线（ADR/AE）：0832-8808022

邮箱:phv@huiyupharma.com

官网:<http://www.huiyupharma.com/yjfkd.html>

通过报告副作用，您可以帮助提供有关该药物安全性的更多信息。